... les invariants de Gromov-Witten

• É. MANN

1. Géométrie énumérative

La géométrie énumérative est une branche des mathématiques où l'on compte des objets géométriques et plus précisément ici des courbes complexes (c'est-à-dire des surfaces réelles, cf. figure 1) qui ont certaines propriétés d'incidence comme passer par des points.

FIGURE 1 – En haut, nous avons le dessin heuristique d'une surface réelle et en bas sa représentation comme courbe complexe

La question la plus naïve est de voir ces courbes comme des droites. Ainsi, la première question est : combien y a-t-il de droites qui passent par 2 points ? Évidemment, la réponse est qu'il n'y en a qu'une

seule, mais en fait cette question est mal formulée pour plusieurs raisons :

1. D'abord, pourquoi 2 points ? Si nous n'avons qu'un seul point, nous avons un nombre infini de droites et si nous avons trop de points (au dessus de 3) non alignés nous n'avons aucune droite. Nous voyons qu'il faut poser un nombre précis de conditions pour que ce nombre soit fini et non nul. Si nous bougeons nos 2 points, nous avons toujours une unique droite sauf si bien sûr les deux points se rencontrent ! Intuitivement, nous obtenons alors une condition sur les points qu'on appelle 2 points *généraux* c'est-à-dire sans aucune particularité.
2. Ensuite, ces droites appartiennent à quel espace ? Nous pouvons nous poser la question dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$, un espace projectif ou une variété quelconque. Pour compter de manière satisfaisante les objets, nous voyons vite que nous avons besoin du corps des nombres complexes¹. Par exemple, une courbe $x^2 + y^2 = -1$ n'a pas de points réels alors qu'elle en possède dans $\mathbb{C}$. Dans la suite, nous allons garder l'espace projectif complexe $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^r$ comme exemple. Pour des raisons techniques, nous aurons besoin de compacité dans la suite mais le lecteur, peu familier avec l'espace projectif, peut le remplacer simplement par $\mathbb{C}^r$.
3. La dernière question est celle du comptage à proprement parler. Nous savons que pour avoir des beaux résultats pour sur les racines des polynômes, il faut les compter avec leurs multiplicités. Dans notre cas de comptage de courbes, nous avons aussi à prendre en compte leurs multiplicités, pour cela nous utilisons la théorie de l'intersection « à la Fulton » que nous n'allons pas trop développer ici.

1. Nous pouvons aussi compter sur le corps des nombres réels mais ce nombre va dépendre de la position des points et c'est une toute autre histoire.

Remarquons que la droite est une courbe de degré 1 et nous avons fixé 2 points. Une généralisation naturelle est de considérer une courbe de degré d .

Question : Combien de points devons-nous fixer pour avoir un nombre fini et non nul de courbes de degré d passant par ces points dans le plan projectif $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$?

La réponse est $3d - 1$ points. Ceci se comprend de la manière suivante. Nous comptons le nombre d'applications

$$f : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

$$[x : y] \mapsto [f_0(x, y) : f_1(x, y) : f_2(x, y)]$$

où f_1, f_2, f_3 sont des polynômes homogènes de degré d c'est-à-dire qu'ils sont de la forme

$$a_0x^d + a_1x^{d-1}y + \dots + a_dy^d.$$

Au final, nous avons donc $d + 1$ degrés de liberté (i.e., les $a_0, \dots, a_d$) pour chaque polynôme et donc au total $3(d + 1)$ paramètres. Cependant, nous devons soustraire 1 à ce nombre car dans l'espace projectif $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, nous pouvons multiplier toutes les coordonnées par un scalaire sans rien changer. De plus, comme nous nous intéressons à l'image de ces applications, nous pouvons reparamétriser la source de ces applications, c'est-à-dire les applications $f, g : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ sont équivalentes s'il existe un isomorphisme $\varphi : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ qui fait commuter le diagramme suivant

Nous savons que les automorphismes de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ sont les homographies (c'est le groupe $\text{PGL}(2, \mathbb{C})$) et que ce groupe est de dimension 3.

Au final, nous obtenons le décompte du nombre de degrés de liberté qui est

$$3(d + 1) - 1 - 3 = 3d - 1.$$

Ainsi, pour avoir un nombre fini de courbes de degré d , il faut fixer $3d - 1$ conditions. Remarquez que depuis le début, nous n'avons compté que des courbes de genre 0. La même question en genre supérieur est beaucoup plus délicate.

Nous appelons $N(d)$ le nombre de courbes de genre 0 de degré d dans le plan projectif complexe, qui passent par $3d - 1$ points généraux. Ces nombres sont des exemples d'invariants de Gromov-Witten pour le plan projectif. Des résultats classiques nous donnent les premières valeurs de $N(1), N(2), N(3)$ et $N(4)$.

d	1	2	3	4	5	...
N(d)	1	1	12	620	?	...

Après le degré 5, nous ne savons rien jusqu'à ce que Kontsevich découvre la formule suivante à la suite des travaux de Witten et de Candelas-Ossa-Green-Park.

$$N(d) = \sum_{\substack{k, \ell \in \{1, \dots, d-1\} \\ k+\ell=d}} N(k)N(\ell)k^2\ell \left(\ell \binom{3d-4}{3k-2} - k \binom{3d-4}{3k-1} \right) \quad (1)$$

La surprise de cette formule est que non seulement, elle permet de calculer tous les nombres $N(d)$ mais aussi qu'elle est récursive, et donc déterminée seulement par $N(1) = 1$, c'est-à-dire le nombre de droites passant par 2 points distincts.

Premiers pas vers une définition plus générale et plus rigoureuse. En première approximation, la définition des nombres $N(d)$ est correcte mais elle a quelques faiblesses.

1. Dans $N(d)$, la courbe de départ est de genre 0 et nous voudrions généraliser au genre supérieur et nous voudrions également remplacer $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ par une variété lisse et projective X . Du coup, nous considérons des applications $f : C \rightarrow X$ de degré d fixé et C est une courbe de genre g .
2. Au lieu de passer par des points, nous pourrions demander que la courbe, ou plutôt son image par f , passe par des sous-variétés fixées. Pour ce faire, nous considérons des courbes C avec des points marqués, notés $x_1, \dots, x_n$. Nous choisissons $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des classes de cohomologie qui représentent via la dualité de Poincaré des sous-variétés en position générale dans X et nous demandons que pour chaque i dans $\{1, \dots, n\}$, $f(x_i)$ soit un point sur la sous-variété de classe α_i .

Au final, pour définir les invariants de Gromov-Witten qui seront des nombres rationnels, il nous faut une variété lisse et projective X , des entiers (g, n, d) et n classes de cohomologie de X notées $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Remarquons que pour que le problème d'incidence soit bien posé, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une infinité de possibilité ou trop de contraintes (cf. la discussion en (1)), il y a une condition entre ces données pour que les invariants soient finis et non nuls.

Le cas de $N(d)$ correspond à $X = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, $g = 0$, $n = 3d - 1$, les classes α_i sont toutes égales à la classe du point dans la cohomologie de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Remarquons que dans cet exemple, le degré d fixe aussi n , ceci est la condition entre ces données dont on vient de parler quelques lignes plus haut.

Dans le paragraphe suivant, nous allons donner d'autres motivations qui viennent de la physique et aussi une définition plus rigoureuse de ces nombres.

2. Définition des invariants de Gromov-Witten

Avant de donner une définition plus précise de ces invariants en mathématique, rappelons les motivations provenant de la théorie des cordes. Dans cette théorie, il y a deux nouvelles idées par rapport à la physique classique.

1. L'espace temps $\mathbb{R}^4$ est remplacé par un espace $\mathbb{R}^4 \times X$ où X est une variété de « taille » tellement petite qu'on ne la verra jamais ($\sim 10^{-33}$ cm).
2. Les particules ne sont pas ponctuelles mais des « petits » cercles qu'on appelle des cordes. Ainsi, quand une corde se déplace dans $\mathbb{R}^4 \times X$, elle dessine un cylindre et quand deux cordes se rencontrent, elles dessinent un pantalon. Au final ces pantalons peuvent se recoller et on obtient des surfaces réelles (cf. figure 2). Comme les trajectoires dans $\mathbb{R}^4$ sont décrites par la physique classique, le but est de comprendre ces trajectoires dans la variété X .

FIGURE 2 – Ce dessin représente 3 cordes qui se rencontrent en une seule corde puis elles se reséparent en 3 cordes et elles finissent avec 2 cordes

Le lien avec la partie de géométrie énumérative du paragraphe précédente se fait naturellement en imaginant ces trajectoires de cordes comme des applications d'une surface réelle dans X . Dans l'exemple précédent, la variété X était $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Cette idée a donné naissance aux invariants de Witten qui étaient définis seulement en physique des cordes.

En mathématiques, Mikhaïl Gromov a défini des invariants en considérant des applications holomorphes d'une surface réelle dans une variété X . Cette idée a été développée avec des outils de géométrie symplectique. Au milieu des années 1990, en généralisant les idées mathématiques de Gromov et celles de Witten, plusieurs mathématiciens ont défini, de façon rigoureuse, ces nombres rationnels, appelé invariants de Gromov-Witten. Il y a deux approches : l'une avec la géométrie symplectique (Yongbin Ruan, Gang Tian, Jun Li, Kenji Fukaya, Kaoru Ono...) et l'autre avec la géométrie algébrique (Maxim Kontsevich, Yuri Manin, Kai Behrend, Barbara Fantechi, William Fulton, Rahul Pandharipande...).

Dans ces deux approches (symplectique ou algébrique), les mathématiciens construisent un espace appelé « espace de modules des applications stables » qui traduit la discussion de la fin du paragraphe 1.

Les points de cet espace sont les données $(C, x_1, \dots, x_n, f)$ où $(C, x_1, \dots, x_n)$ est une courbe complexe nodale (c'est-à-dire avec des singularités localement du type $xy = 0$ cf. la figure 1) de genre g (vue comme surface réelle, c'est un tore avec g

trous) avec $x_1, \dots, x_n$ des points marqués distincts, et f est une application de C dans $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^r$ de degré d . Nous notons cet espace $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^r, d)$. Le fait $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^r$ soit compact et que nous ayons rajouté des singularités nodales implique que cet espace est compact (c'est pour cette raison qu'il y a une barre dans la notation $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k, d)$). La compacité de cet espace de module n'est pas évidente. En effet, quelle est la limite quand 2 points marqués se rencontrent? La réponse de Gromov était très belle dans [6], il a expliqué qu'il fallait rajouter un $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$. Plus précisément, si x_1 et x_2 se rencontrent au point p de la courbe C alors la limite est la courbe C auquel on colle un $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ au point p de C et les points p, x_1 et x_2 sur le $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ sont $\{0, 1, \infty\}$. Cette idée est connue sous le terme « d'ajout de bulles » (cf. figure 3).

À partir de cet espace, nous avons des applications d'évaluation. Plus précisément, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, nous définissons

$$\begin{aligned} \text{ev}_i : \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k, d) &\rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k \\ (C, x_1, \dots, x_n, f) &\mapsto f(x_i). \end{aligned}$$

Si nous avons $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des classes de cohomologie sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k$, nous pouvons les tirer en arrière sur l'espace $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k, d)$ via les applications ev_i puis les intégrer dessus. Au final, nous définissons les invariants de Gromov-Witten par l'intégrale

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,d} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k, d)]} \text{ev}_1^* \alpha_1 \otimes \dots \otimes \text{ev}_n^* \alpha_n \in \mathbb{Q}. \tag{2}$$

1. Ces invariants sont des nombres rationnels même si les α_i sont des classes à coefficient entiers car l'espace d'intégration n'est pas une variété, mais une orbifold c'est-à-dire localement le quotient d'un ouvert de $\mathbb{C}^k$ par un groupe fini.
2. Remarquons que cette intégrale est nulle dès que la dimension de $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k, d)$ n'est pas égale à la somme des degrés cohomologiques des α_i . Ceci modélise la question du nombre de conditions nécessaires pour que nous ayons un nombre fini et non nul de courbes vérifiant des conditions d'incidence (cf. la discussion intuitive au §1.(1)).
3. Pour définir une telle intégrale, il faut que l'espace d'intégration soit compact et lisse. La compacité est vraie mais pas la lissité ce qui cause de sérieux soucis. Cependant, dans [1], Behrend-Fantechi ont expliqué comment définir proprement cette intégrale, c'est-à-dire

sur quel cycle nous devons intégrer : cette classe est appelée la *classe fondamentale virtuelle*. Leur réponse repose sur la déformation au cône normal et la théorie de l'intersection. Remarquons que l'espace de modules $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$ est lisse en genre 0 et quand X est un espace projectif ou une grassmannienne. Dès que le genre est strictement positif, l'espace de modules n'est jamais lisse et donc le calcul fait intervenir cette classe virtuelle ; les calculs deviennent beaucoup plus compliqués.

Dans l'exemple de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, notons $[\text{pt}]$ la classe du point qui est dans le $H_0(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2)$. Ce groupe est isomorphe au $H^4(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2)$ par dualité de Poincaré. La « vraie » définition de $N(d)$ correspond aux choix $g = 0, n = 3d - 1$ et $\alpha_1 = \dots = \alpha_{3d-1} = [\text{pt}]$ et nous avons :

$$N(d) = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{0,3d-1}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, d)]} \prod_{i=1}^{3d-1} \text{ev}_i^* [\text{pt}].$$

Si nous prenons cette égalité comme la définition de $N(d)$ alors la théorie de l'intersection nous dit que ce nombre $N(d)$ est bien égal à celui défini dans le §1. L'exemple $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ est assez particulier car tous les invariants de genre 0 peuvent se déduire des invariants ci-dessus. Cependant les invariants de genre supérieur sont très délicats à calculer. Il faut utiliser des méthodes avancées qui seront décrites plus bas.

Quelles sont les propriétés d'invariance de ces nombres? La réponse est qu'ils sont invariants par déformation lisse et propre. Plus précisément, considérons une famille de variétés paramétrées par une base B , par exemple $B = \mathbb{C}$ et la famille de variété est notée $(X_t)_{t \in \mathbb{C}}$. Les conditions de lissité et de propreté signifient que les variétés X_t sont lisses projectives avec des cohomologies isomorphes. Ainsi cette invariance par déformation lisse et propre se formule en disant que les invariants de Gromov-Witten de X_t ne dépendent pas de t .

3. Comment calculer ces invariants de Gromov-Witten

Une fois que nous avons défini ces invariants, nous voulons les calculer. Il y a plusieurs techniques pour les calculer.

FIGURE 3 – On a une famille d’applications stables $(f_t, C_t)_{t \in \mathbb{C}}$ où x_5 tend vers x_4 quand $t \rightarrow 0$. À la limite, on a une formation de « bulle » qui est le $\mathbb{P}^1$ avec les points marqués x_4, x_5 . L’application f_0 est constante sur cette bulle et donc $f_0(\mathbb{P}^1) = f_0(p)$.

Faire une série génératrice, appelée potentiel de Gromov-Witten. Pour ce faire nous mettons ces nombres dans une série génératrice et nous cherchons des équations différentielles vérifiées par cette série génératrice.

Prenons l'exemple de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, rappelons que la cohomologie de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ à coefficients complexes est un espace vectoriel de dimension 3 qui se décompose en trois sous-espaces vectoriels de dimension 1 qui sont $\bigoplus_{i=0}^2 H^{2i}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, \mathbb{C})$. Choisissons une base « naturelle » $\langle [1], [H], [pt] \rangle$ où $[1] \in H^0(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, \mathbb{C})$ est la classe de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, $[H]$ est la classe d'une droite dans $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ et $[pt]$ la classe d'un point dans $H^4(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, \mathbb{C})$.

Notons t_0, t_1, t_2 les coordonnées associées à cette base. Ainsi, un point de cet espace vectoriel est de la forme $t_0[1] + t_1[H] + t_2[pt]$ avec t_0, t_1, t_2 dans $\mathbb{C}$. Nous définissons alors une fonction, appelée potentiel de Gromov-Witten, sur cette cohomologie :

$$\mathcal{F}_0^{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}(t_0, t_1, t_2) = \sum_{d \in \mathbb{N}} \sum_{n \geq 0} \sum_{\substack{k_0, k_1, k_2 \\ k_0 + k_1 + k_2 = n}} \frac{t_0^{k_0} t_1^{k_1} t_2^{k_2}}{k_0! k_1! k_2!} \langle \underbrace{[1], \dots, [1]}_{k_0}, \underbrace{[H], \dots, [H]}_{k_1}, \underbrace{[pt], \dots, [pt]}_{k_2} \rangle_{0, n, d}$$

où le crochet $\langle \cdot, \dots, \cdot \rangle_{0, n, d}$ est défini par (2). On peut simplifier la forme du potentiel en utilisant les propriétés suivantes.

1. Si $d = 0$, on compte les applications constantes. L'espace de modules est simplement $\overline{\mathcal{M}}_{0, n} \times \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ où $\overline{\mathcal{M}}_{g, n}$ est l'espace des modules quand X est un point. On en déduit³ que

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{0, n, d=0} := \begin{cases} \int_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2} \alpha_1 \cup \alpha_2 \cup \alpha_3 & \text{si } n = 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Si $d > 0$, avoir un $[H]$ dans l'invariant de GW en i -ième position, signifie que le i -ième point marqué doit appartenir à une droite. Or on sait que dans $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, une droite coupe une courbe de degré d en d points, ainsi on a la formule récursive suivante

$$\langle [H], \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{0, n+1, d} = d \cdot \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{0, n, d} \quad (3)$$

3. Si $d > 0$, avoir un $[1]$ dans l'invariant de GW en i -ième position, signifie intuitivement que l'image du i -ième point marqué doit appartenir à la classe $[1]$ qui est, rappelons-le, $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Ainsi, cette condition d'incidence n'apporte aucune condition et on peut l'oublier. On a donc

$$\langle [1], \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{0, n+1, d} = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{0, n, d} \quad (4)$$

En utilisant les trois propriétés ci-dessus, cette

2. Le lecteur attentif aura vu que nos notations sont homologiques : espace total, droite et point alors que nous regardons la cohomologie. Ceci permet d'avoir une idée intuitive des conditions d'incidences et la dualité de Poincaré nous identifie pour $i \in \{0, 1, 2\}$, $H^i(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, \mathbb{C}) = H_{4-i}(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2, \mathbb{C})$.

3. Cet argument n'est pas spécifique à $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ et fonctionne pour toute variété X .

série génératrice peut se réécrire plus simplement :

$$\mathcal{F}_0^{\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}}(t_0, t_1, t_2) = \frac{t_1^2 t_0}{2} + \frac{t_0^2 t_2}{2} + \sum_{d \in \mathbb{N}^*} N(d) e^{dt_1} \frac{t_2^{3d-1}}{(3d-1)!}. \quad (5)$$

Les deux premiers termes correspondent à $d = 0$, la propriété (3) nous dit qu'on peut oublier les classes [1] et la formule (4) nous permet de garder uniquement les classes [pt] avec devant le coefficient d^{k_1} ce qui donne une exponentielle après la sommation.

Cette fonction satisfait l'équation différentielle appelée équation WDVV (pour Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde)

$$\partial_{t_2} \partial_{t_2} \partial_{t_2} \mathcal{F}_0^{\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}} + \left(\partial_{t_1} \partial_{t_1} \partial_{t_1} \mathcal{F}_0^{\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}} \right) \cdot \left(\partial_{t_1} \partial_{t_2} \partial_{t_2} \mathcal{F}_0^{\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}} \right) = \left(\partial_{t_1} \partial_{t_2} \partial_{t_2} \mathcal{F}_0^{\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}} \right)^2.$$

Remarquons que la formule spectaculaire (1) a été trouvée simplement en identifiant les termes devant $e^{dt_1} t_2^{3d-1}$ dans l'équation ci-dessus. Même si cette technique fonctionne très bien en genre 0, elle a ses limites notamment pour calculer ces invariants de genre supérieur.

Utiliser une déformation plate pour dégénérer X en morceaux plus simples. Comme ces nombres sont invariants par déformation lisse, il est naturel de se poser la question sur une déformation un peu plus générale par exemple une déformation plate. Cette dernière est une généralisation de la situation suivante : la famille d'hyperboles $xy = t$ pour $t \in \mathbb{C}^*$ dégénère quand $t = 0$ en l'union de 2 droites $xy = 0$. Ainsi, nous essayons de déformer X en une variété singulière Y avec 2 morceaux Y_1 et Y_2 qui se recollent le long d'une hypersurface, c'est-à-dire $Y = Y_1 \cup Y_2$. En théorie, nous imaginons que Y_1 et Y_2 sont plus simples c'est-à-dire que nous arrivons à calculer leurs invariants de Gromov-Witten. Remarquons que la variété Y n'est plus lisse et donc la théorie générale de Gromov-Witten ne s'applique plus. Cependant, dans [8], Jun Li a démontré que sous certaines hypothèses, on peut retrouver les invariants de Gromov-Witten de X en connaissant ceux de Y_1 et Y_2 . Nous obtenons une formule qui s'appelle la formule de dégénérescence.

Faire une récurrence en recollant les courbes. Supposons que nous avons deux applications

stables $(C_1, x_1, \dots, x_4, f_1)$ et $(C_2, y_1, \dots, y_3, f_2)$ telles que $f_1(x_1) = f_2(y_3)$ (cf. figure 4). Nous pouvons les recoller en identifiant les points marqués (par exemple ici x_1 et y_3) et nous obtenons une application stable, notée $f_1 \cup f_2$ de degré $d_1 + d_2$ d'une courbe de genre $g_1 + g_2$ vers $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$.

Du coup, nous pouvons espérer calculer les invariants en genre supérieur en cassant les courbes en morceaux de genre et de degré plus petit. Nous obtenons alors une récurrence sur le degré et le genre. Cette idée forte a donné beaucoup d'algorithmes : la récursion topologique de Chekhov-Eynard-Orantin (voir [2]) et la théorie cohomologique des champs.

Utiliser une formule de localisation. Supposons que nous ayons un groupe G qui agisse sur X (par exemple si X est une variété torique et $G = (\mathbb{C}^*)^n$). Alors nous pouvons faire agir le groupe sur l'espace de modules et l'intégrale (2) se calcule via les points fixes de cette action sur $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$ (cf. Graber-Pandharipande [5]).

4. Autres domaines en lien avec les invariants de Gromov-Witten

À part calculer les invariants de Gromov-Witten, il y a aussi beaucoup de liens entre ces nombres et d'autres domaines des mathématiques. Ces relations viennent pour la plupart des idées de la physique des cordes.

Symétrie miroir . La symétrie miroir en mathématique a des formulations très variées. Un des exemples surprenants est qu'à partir de la théorie des singularités du polynôme de Laurent $x + y + (xy)^{-1}$, nous pouvons calculer les invariants de Gromov-Witten de $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$.

Conjecture de Witten. La conjecture de Witten, que Kontsevich a démontrée dans [7], établit que le potentiel de Gromov-Witten du point (c'est-à-dire où nous avons remplacé $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}$ par un point dans (5)) est la fonction tau de la hiérarchie KdV (Korteweg-de Vries). Une hiérarchie est une suite infinie d'équations aux dérivées partielles dont les flots commutent deux à deux et la fonction tau d'une hiérarchie encode d'une certaine façon les solutions à ces équations. Ce résultat est très spectaculaire car il relie les invariants de Gromov-Witten du point à des constantes qui apparaissent dans une solution du système intégrable historique KdV.

FIGURE 4 – On peut recoller les applications stables ci-dessus car $f_1(x_1) = f_2(y_3)$.

Le lecteur attentif remarquera que la géométrie énumérative du point doit être assez facile. C’est effectivement le cas mais ici Witten rajoute des choses. En effet, il n’y a qu’une seule application de $C \rightarrow \text{pt}$, du coup l’espace de modules est simplement donnée par la courbe C de genre g avec n points marqués, noté $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$. Sur cet espace, il y a des fibrés en droite complexes naturels, notés $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_n$, qui sont les espaces cotangents à la courbe aux points marqués. Ces fibrés donnent naissance à des classes de cohomologie, notées $\psi_1, \dots, \psi_n$, sur $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$. Nous obtenons des nombres rationnels en intégrant les puissances de ces premières classes de Chern sur $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ c’est-à-dire

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \psi_1^{k_1} \cup \dots \cup \psi_n^{k_n}.$$

Dans le cas des classes ψ , il n’y a plus d’interprétation énumérative évidente mais nous avons une structure plus riche. En genre zéro, on peut calculer ces nombres et nous avons

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,n}} \psi_1^{k_1} \cup \dots \cup \psi_n^{k_n} = \binom{k_1, \dots, k_n}{n} \delta_{n-3, k_1 + \dots + k_n}$$

où $\delta_{i,j}$ est le symbole de Kronecker.

Un autre exemple historique est le cas $g = 1, n = 1$, en effet $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$ est l’espace de module des courbes elliptiques avec un point marqué et il est isomorphe à l’espace projectif à poids

4. C’est-à-dire le quotient de $\mathbb{C}^2 - \{0,0\}$ par l’action de $\mathbb{C}^*$ donnée par $\lambda(x, y) = (\lambda^4 x, \lambda^6 y)$.

$\mathbb{P}(4, 6)^4$. En utilisant l’intégration sur les champs algébriques, on a $\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \psi_1 = 1/24$.

Correspondance Landau-Ginzburg vs Calabi-Yau. Cette correspondance, imaginée par Witten, prédit une relation entre les invariants de Gromov-Witten d’une variété de Calabi-Yau et des invariants de Fan-Jarvis-Ruan-Witten d’un polynôme. Dans [3], Alessandro Chiodo et Yongbin Ruan ont démontré cette correspondance dans le cas suivant. D’un coté, nous prenons les invariants de Gromov-Witten d’une quintique dans $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^4$ donnée par les zéros d’un polynôme homogène de degré 5 : par exemple $W = x_0^5 + \dots + x_4^5$ où $[x_0 : \dots : x_4]$ sont les coordonnées homogènes sur $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^4$. Nous obtenons alors une série génératrice associée à ces invariants de Gromov-Witten.

D’un autre coté, nous calculons des invariants qui comptent le nombre de courbes (orbifold) complexes munies de fibrés en droites, qui vérifient certaines conditions. Ces invariants sont appelés, les invariants de Fan-Jarvis-Ruan-Witten et nous construisons une autre série génératrice avec ces invariants.

Cette correspondance prédit que les deux séries génératrices construites à partir de ces deux familles d’invariants sont égales après un changement de variable bien choisi.

Théorie cohomologique des champs. Une théorie cohomologique de champs est la donnée d'un espace vectoriel de dimension finie, noté V , et d'une famille $\varphi = (\varphi_{g,n})_{g,n}$ d'applications

$$\varphi_{g,n} : V \otimes \cdots \otimes V \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

qui vérifient certaines conditions, notamment des conditions de recollements sur les courbes.

Par exemple, la théorie de Gromov-Witten produit pour chaque variété lisse et projective, notée X , une théorie cohomologique de champs, notée φ^X avec $V = H^*(X)$. En particulier, la théorie de Gromov-Witten (avec les classes ψ cf. conjecture de Witten) où X est un point produit un exemple particulièrement simple mais important (voir plus bas).

Une question naturelle est de savoir si étant données deux variétés projectives lisses X_1 et X_2 , nous pouvons relier les théories cohomologiques des champs φ^{X_1} avec φ^{X_2} . Dans [4], Alexander Givental a prédit une telle relation dans certains cas et Constantin Teleman l'a démontrée dans [9].

Plus précisément, Givental a trouvé un groupe, noté G , qui agit sur les théories cohomologiques des champs, c'est-à-dire pour tout $h \in G$, et pour toute théorie cohomologique des champs φ , on peut construire une autre théorie cohomologique des champs notée $h\varphi$. Le résultat spectaculaire de Givental-Teleman est que si la théorie cohomologique des champs φ est « semi-simple » avec un espace vectoriel de dimension r (par exemple celle provenant de la théorie de Gromov-Witten de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^{r-1}$ est semi-simple) alors nous pouvons trouver un élément dans le groupe de Givental qui envoie la théorie cohomologique des champs de r points sur φ . Cette construction est complexe mais assez explicite pour pouvoir faire des calculs en particulier, ceci permet de calculer les invariants de Gromov-Witten de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^k$ en genre supérieur.

Références

- [1] K. BEHREND et B. FANTECHI. « The intrinsic normal cone ». *Invent. Math.* **128**, n° 1 (1997), p. 45-88.
- [2] L. CHEKHOV, B. EYNARD et N. ORANTIN. « Free energy topological expansion for the 2-matrix model ». *J. High Energy Phys.*, n° 12 (2006), p. 053, 31.
- [3] A. CHIODO et Y. RUAN. « Landau-Ginzburg/Calabi-Yau correspondence for quintic three-folds via symplectic transformations ». *Invent. Math.* **182**, n° 1 (2010), p. 117-165.
- [4] A. B. GIVENTAL. « Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians ». In : vol. 1. 4. Dedicated to the memory of I. G. Petrovskii on the occasion of his 100th anniversary. 2001, p. 551-568, 645.
- [5] T. GRABER et R. PANDHARIPANDE. « Localization of virtual classes ». *Invent. Math.* **135**, n° 2 (1999), p. 487-518.
- [6] GROMOV. « Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds ». *Invent. Math.* **82**, n° 2 (1985), p. 307-347.
- [7] M. KONTSEVICH. « Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function ». *Comm. Math. Phys.* **147**, n° 1 (1992), p. 1-23.
- [8] J. LI. « A degeneration formula of GW-invariants ». *J. Differential Geom.* **60**, n° 2 (2002), p. 199-293.
- [9] C. TELEMAN. « The structure of 2D semi-simple field theories ». *Invent. Math.* **188**, n° 3 (2012), p. 525-588.

Étienne MANN

LAREMA, Université d'Angers
 etienne.mann@univ-angers.fr

L'auteur travaille en géométrie algébrique et plus précisément sur les invariants de Gromov-Witten et la symétrie miroir. Ces dernières années, il essaye d'utiliser des idées de géométrie algébrique dérivée pour traiter plus géométriquement ces questions.